

# Corcel®

Suspensión oral  
**Antiparasitario interno**



**Composición** Cada mL de **Corcel** contiene:

Oxibendazol 20 %

**Descripción**

Antihelmíntico benzimidazol de amplio espectro para equinos. Su acción se basa en la unión a la tubulina del nemátodo, bloqueando la formación de micro-túbulos de las células intestinales del parásito, que suprime la capacidad de absorber nutrientes, lo cual genera la muerte del parásito.

Indicado para el control de parásitos gastrointestinales: *Strongylus grandes* y *pequeños*, *Parascaris*, *Strongyloides* y *Oxyuros* en todos sus estados.

**Indicado en** Equinos

**Dosificación**

La dosis media recomendada es de 10 mg de oxibendazole por kg de peso.

En la práctica, administrar 1 mL del producto por cada 20 kg de peso.

Para el tratamiento de *Strongyloides westeri* se recomienda una dosis de 15 mg por kg de peso, en la práctica, 1.5 mL por cada 20 kg de peso.

La frecuencia y la duración del tratamiento quedan a criterio del Médico Veterinario.

**Modo de uso**

Colocar la jeringa en la comisura labial del animal y administrar la dosis recomendada.

Reg ICA: 5038 DB



**Presentaciones**

Jeringa por 20 mL

Frasco por 100 mL